

اطلاعیه شماره ۱۱

تاریخ: ۱۳۷۸/۱۱/۴

افتادگی مچ پا ناشی از تزریق آمپول پیروکسیکام

پیروکسیکام یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی است که فقط در اختلالات مفصلی و اسکلتی-عضلانی نظیر اسپوندیلیت آنکیلوزان، استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید و نفرس حاد مورد مصرف دارد.

اخیراً دو مورد عارضه افتادگی مچ پا در اثر تزریق عضلانی آمپول پیروکسیکام در کودکان به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش شده است. لذا به منظور پیشگیری از عوارض شدید ناشی از تزریق این دارو، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می‌نمائیم:

۱- تزریق آمپول پیروکسیکام در کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. از تجویز این آمپول در این گروه سنی باید جداً خودداری شود.

۲- تجویز فرم تزریقی پیروکسیکام به منظور کاهش تب، به خصوص در کودکان، جزو موارد مصرف این دارو نیست.

۳- درد و گاهی نکروز در محل تزریق از عوارض ناشی از تزریق عضلانی این دارو می‌باشد.

۴- به منظور کاهش تخریب بافتی در محل تزریق، توصیه می‌شود به صورت عمیق درعضله سرینی تزریق گردد.

۵- فرمولاسیون این آمپول فقط جهت تزریق عضلانی است، از تزریق وریدی آن باید جداً خودداری شود.

خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه عارضه، فرم مخصوص ثبت و بررسی عوارض داروها را تکمیل نموده، به آدرس تهران صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ ارسال نمایید و یا با شماره تلفن ۶۴۰۵۵۶۹ تماس حاصل فرمائید.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه- معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی