

سفالوسپورین های تزریقی نیز شوک آنافیلاکسی می دهند سفالوسپورین ها مانند پنی سیلین ها می توانند واکنشهای شدید حساسیتی ایجاد نمایند

به اطلاع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارشات متعددی مبنی بر بروز واکنشهای شدید حساسیتی متعاقب تزریق سفتریاکسون (فرآورده ای از نسل سوم سفالوسپورین ها) دریافت نموده است. به منظور پیشگیری از بروز این قبیل عوارض توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:

- ۱- آنافیلاکسی ناشی از سفالوسپورین ها از جمله عوارض ذکر شده در مراجع دارویی می باشد و حتی ممکن است بیشتر از پنی سیلین ها رخ دهد.
- ۲- از آنجایی که میزان مصرف سفتریاکسون در کشور طی سالهای اخیر شدیداً روبه رشد بوده است، فراوانی واکنشهای شدید حساسیتی ناشی از مصرف سفتریاکسون نیز رو به افزایش دارد.
- ۳- پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها حساسیت متقاطع دارند. لذا اکیداً توصیه می گردد پیش از تجویز داروهای متعلق به هر یک از این دو دسته، در مورد سابقه حساسیت به آنتی بیوتیک ها از بیمار سوال گردد و چنانچه بیمار نسبت به هر نوع سفالوسپورین یا پنی سیلین حساسیت گزارش نماید تجویز داروی دیگر از دسته سفالوسپورین ها یا پنی سیلین ها در مواقع ضروری با احتیاط صورت گیرد.
- ۴- به استناد اکثریت منابع و فارماکوپه ها تزریق وریدی سفتریاکسون باید طی ۱۵ الی ۳۰ دقیقه صورت پذیرد لذا اکیداً توصیه می گردد که تزریق وریدی این دارو در کمتر از ۱۵ دقیقه صورت نگیرد.

لازم به ذکر است که سفالوسپورین های موجود در بازار دارویی ایران در حال حاضر شامل موارد زیر می باشد:
سفالوسپورین های نسل اول: سفازولین، سفرادین، سفالکسین، سفالوتین
سفالوسپورین های نسل سوم: سفتریاکسون، سفتری زوکسیم، سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سفیکسیم
سفالوسپورین های نسل چهارم: سفپیم

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف داروی مذکور، مراتب را از طریق فرم های زرد و یا به صورت تلفنی (شماره تلفن: ۶۴۰۴۲۲۳) به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
دفتر تحقیق و توسعه-معاونت غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی