

هشدار در رابطه با ایجاد مسمومیت کشنده با متادون در اطفال

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند که مرکز ADR، چهار مورد گزارش مبنی بر مسمومیت با متادون در اطفال دریافت نموده است. مورد اول دختر ۷ ساله‌ای بوده که بدلیل مصرف نوشابه حاوی داروی متادون فوت نموده است. بر طبق گزارش ارسالی به مرکز، یکی از بستگان کودک که شربت متادون را به منظور ترک اعتیاد مصرف می‌نموده‌اند، به قصد استفاده از دارو به همراه غذا، شربت متادون را داخل شیشه نوشابه ریخته‌اند که کودک به اشتباه آنرا مصرف نموده، بعد از مدت کوتاهی دچار تهوع، استفراغ، درد قفسه سینه و دیگر علایم مسمومیت می‌شود و بعد از گذشت چند ساعت علایم پیشرفت نموده، متأسفانه کودک فوت می‌نماید.

مورد دوم پسر ۲ ساله‌ای بوده است که مبادرت به نوشیدن شربت متادون پدربرزرگ خود که داخل یخچال نگهداری می‌شده است، می‌نماید که خوشبختانه سریعاً به بیمارستان مسمومین انتقال داده شده، با دریافت نالوکسان و یس از گذشت دو روز از مرگ نجات می‌یابد.

ساخر مواد نیز کودکان ۳ و ۴ ساله‌ای بوره‌اند که نظری مواد فوق الذکر به اشتباه متادون مصرفی توسط بستگان بعتار را مصرف نموده، دچار علائم مسمومیت کشنده‌اند که یس از اقدامات درمانی بهبود یافته‌اند. مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها به منظور پیشگیری از بروز فجایع مشابه، توجه همکاران محترم جامعه پژوهشکی را به موارد زیر جلب می‌نماید:

- ۱- از تحويل شربت متادون، حتی در دوزهای بسیار پائین، در شیشه‌های غیر دارویی (نخلیز بطری نوشابه و ...) و شیشه‌های بدون برچسب حاوی نام دارو و سایر نکات لازم اکیداً خوبداری گردد.
- ۲- در صورت امکان، تحويل دوز مورد نیاز بصورت روزانه در مرکز ترک اعتیاد انجام پذیرد.
- ۳- بدلیل بروز مسمومیت شدید در اطفال و افراد غیرمعتمد، شیشه‌های حاوی متادون می‌بایست دارای برچسب مخصوص هشدار دهنده حاوی نام فراورده و توضیحات لازم مربوط به نحوه مصرف دارو باشند.
- ۴- از انگلیزیکه طعم شربت متادون شیرین است و مصرف کنندگان دارو در برخی موارد آنرا به همراه چای یا نوشابه مصرف می‌نمایند علاوه بر توضیحات کامل به بیمار و بستگان وی، بر روی برچسب شیشه واضح‌آذکر گردد که از نگهداری دارو در یخچال یا گلتار سایر نوشیدنها خوبداری گردد.
- ۵- بر روی برچسب دارو حتماً ذکر گردد که دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- ۶- در شروع درمان و نیز در تمام طول دوره مصرف دارو، علائم مسمومیت با متادون برای بیمار و بستگان وی توضیح داده شود. از جمله این علائم می‌توان به اختلال هوشیاری، اختلالات تنفسی، نبض ضعیف، اختلالات کوارشی همچون تهوع و استفراغ، نیز سفته و تکانه‌های عضلانی اشاره نمود.
- ۷- در هر دوره مراجعة بیمار، علائم مسمومیت برای وی مرور گردد و تأکید شود که در صورت بروز علائم مسمومیت در بیمار یا بستگان وی حتماً به اورژانس مراجعة نمایند.

از همکاران محترم تقاضا می‌گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروی مذکور مراجعت را از طریق ارسال فرم‌های زرد، نمبر (۰۸۵۷-۴۱۹۳-۹۲۹۸) و با تماس تلفنی (۰۸۸۹۰-۸۵۷) وبا تماس تلفنی (۰۸۸۹۰-۸۵۷) وبا تماس تلفنی (۰۸۸۹۰-۸۵۷) وبا تماس تلفنی (۰۸۸۹۰-۸۵۷)