

که احتمال دارد اشتباها مقدار کشنده ای مصرف کنند.
مصرف دی فنوکسیلات برای درمان اسهال می تواند
باعث مسمومیت شدید شود.

علائم و شکایات :

- ۱- مردمک های بسیار تنگ
- ۲- خواب آلودگی سپس بیهوشی
- ۳- تنفس آهسته
- ۴- انقباض یا تشنج
- ۵- درج حرارت پائین
- ۶- فشار خون پائین
- ۷- ادم ریوی



چگونه آسیب می رساند؟

اوپیوئیدها بر مغز اثر می گذارند به طوری که بیمار عمیقا
بیهوش می شود ممکن است تنفس آهسته تر شود و ناگهان
متوقف شود.

تا چه حد سمی است؟

مقادیر سمی آن میتواند در عرض یک ساعت باعث مرگ
شود، به خصوص اگر همراه با الکل یا مواد دیگری که
فعالیت مغز را کم میکنند مصرف شده باشند.

خطرات ویژه :

ممکن است افرادی که با این مواد درمان می شوند به آن
وابسته شوند و دوران مصرف آن را طولانی کرده و نیاز به
مقادی بیشتری برای بدست آوردن همان اثرات را داشته
باشند.

اوپیوئیدها گروهی از داروها هستند که اثرات مشابه
مورفین دارند مثل کدئین -متادون -مورفین -
دکسترمورفان - تریاک و ... دارند.

اوپیوئیدها برای درمان درد - سرفه و اسهال بکار می
روند .

بعضی ترکیبات آن مثل دی فنوکسیلات به فراوانی در
دسترس مردم می باشد.از این مواد سوء استفاده می
شود، زیرا باعث می شود مردم احساس خوبی داشته
باشند .



هوالشافی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی کرمانشاه
مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره)



عنوان:

مسمومیت با اویوئیدها (مواد شبه تریاک)



مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

تهیه کننده

سهیلا علی اسلام

مسئول آموزش به بیمار

سایت بیمارستان:

www.imamkhomai.kums.ac.ir

منبع:

برونر و سودارث

کد: ۱۳۹۷۷۰-۲۰۲۰

اگر بیمار توهمات دارد او را در یک جای آرام و تاریک
قرار داده و از آسیب حفظ کنید. خودتان آرام و خونسرد باشید
تا بیمار قوت قلب بگیرد هرچه سریعتر بیمار را به
بیمارستان برسانید چون اگر هیچ علامت و شکایتی
نداشته باشد ممکن است در خطر باشد.



ممکن است ناگهان تنفس بیمار قطع شود و بسیار سریع
در عرض چند دقیقه پس از تزریق وریدی تا ۴ ساعت بعد
بمیرد. بیمارانی که به مدت طولانی بیهوش هستند ممکن
است مبتلا به بیماری ریوی شده و دچار مشکلات
فراوانی گردند.

بیماران علامتدار باید در ICU بستری شوند.

چه باید کرد؟

کمکهای اولیه بسیار مهم است اگر بیمار تنفس ندارد
باید راه هوایی باز شده و تنفس دهان به دهان داده شود
و اگر قلب متوقف شده باشد باید ماساژ قلبی داده شود.
اگر بیمار بیهوش یا خواب آلوده باشد او را به یک پهلو
بخوابانید تنفس را هر ده دقیقه بررسی کنید و بیمار را
گرم نگهدارید.

درمورد، دی فنوکسیلات اگر بیمار تب داشته باشد بدنش
را با آب سرد و اسفنج خنک کنید.

