

قرص برنج چیست؟

قرص برنج که با نام علمی «فسفید آلومینیوم» شناخته می شود قرصی به رنگ زرد یا خاکستری کم رنگ است و بویی شبیه به بوی سیر دارد. قرص برنج از نظر طبقه بندی شیمیایی ماده ای بسیار سمی تلقی می گردد.



قرص برنج ماده ای کاملا سمی است که برای کنترل و دفع جانوران موذی مانند موش، و یا کشتن حشرات آسیب رساننده به محصولات کشاورزی و دفع آفات در سیلوهای نگهداری غلات به کار می رود.

قرص برنج هیچگونه مصرف خانگی ندارد.



لازم به ذکر است این قرص با قرص های گیاهی موسوم به «بنان» که در فروشگاهها، عطاری و برخی سوپرمارکت ها جهت مصارف خانگی به فروش می رسد، متفاوت است. قرص برنج علاوه بر جذب از طریق دستگاه گوارش، به علت توانایی سریع در ترکیب با هوا و ایجاد گاز «فسفین» توانایی ایجاد مسمومیت از طریق استنشاقی را نیز دارد. مصرف مقدار بسیار اندک قرص برنج (حتی یک چهارم یک قرص) توانایی ایجاد مسمومیت بسیار شدید را دارد که در بیش از ۸۰٪ موارد به مرگی دردناک منجر می شود.

برای مسمومیت با قرص برنج هیچ پادزهر اختصاصی شناخته شده ای وجود ندارد. هر چند تحقیقات پزشکی، روشهای درمانی متفاوتی برای مسمومیت با قرص برنج پیشنهاد داده اند، اما درمانهای موجود بیشتر جنبه حمایتی دارند. در صورت مصرف، عوارض شدید بر روی سیستم های مختلف بدن باعث مرگ دردناکی خواهد شد.

علائم مسمومیت با قرص برنج:

بوی دهان در تشخیص مسمومیت

استنشاق گاز متصاعد شده از قرص برنج سبب سوزش و التهاب بینی، دهان، حلق و مجاری هوایی، درد قفسه سینه، سرفه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد عضلات، سردرد و سرگیجه می شود.



هوالمشافی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی کرمانشاه
مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره)



عنوان:

قرص برنج



مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

تهیه کننده:

سهیلا علی اسلام

مسئول آموزش به بیمار

سایت بیمارستان:

www.imamkhomeini.kums.ac.ir

منبع:

برونر و سودارت

کد: ۱۳۹۷۴-۲۰۲۰

ناحیه آلوده را به مدت حداقل ۱۰-۱۵ دقیقه با آب ولرم شستشو دهید تا خود را در اسرع وقت به یک مرکز بهداشتی درمانی برسانید.

در صورتی که پوست شما با قرص برنج یا گاز آزاد شده ی ناشی از آن تماس پیدا کرد، لباس های آلوده خود را به سرعت خارج کرده و ناحیه ی تماس را با صابون و آب ولرم پرفشار به مدت حداقل ۱۰-۱۵ دقیقه شستشو دهید و خود را هر چه سریعتر به یک مرکز بهداشتی و درمانی برسانید.

در صورتی که برای نگهداری مصارف کشاورزی مجبور به استفاده از قرص برنج هستید توجه کنید:

قرص ها را در محل های مطمئن و دور از دسترس کودکان و افراد متفرقه قرار دهید.

روش نگهداری و استفاده از این قرص را دقیقا یاد بگیرید. قبل از کسب اطلاعات کافی، از مصرف قرص ها خودداری نمایید. بر روی محل نگهداری و جعبه ی حاوی این قرص ها برچسب های هشدار دهنده نصب کنید.



خوردن قرص برنج موجب درد شکم، تهوع، استفراغ، اسهال، تورم و التهاب لبها، دهان و حلق (و به طبع آن انسداد راههای تنفسی) و تشنج می گردد. بیقراری و اضطراب ممکن است بروز کند. عوارض ایجاد شده منجر به آسیب شدید به ریه ها، قلب، کبد و کلیه ها و در نهایت مرگ می شود. تماس قرص برنج یا گاز آن با پوست منجر به تعریق و قرمزی و التهاب پوست می شود. قابل توجه است که شدت علائم اولیه ارتباطی با شدت مسمومیت ندارد. در بسیاری از موارد در ساعات اولیه مصرف، علائم خاصی بروز داده نمی شود اما عوارض تا ساعتی پس از مصرف به صورت ناگهانی و بسیار شدید ظهور می کند. مرگ به علت عارضه قلبی می تواند رخ دهد.

اگر به صورت اتفاقی در معرض مسمومیت با قرص برنج قرار گرفتیم چه کار کنیم؟

در صورت مصرف قرص برنج به صورت خوراکی یا استنشاق آن، حتی در صورت نداشتن علائم، هر چه سریعتر به بیمارستان مراجعه کنید. اگر قرص برنج و یا گاز آزاد شده ی ناشی از آن با چشم تماس پیدا کرد در صورت داشتن لنز چشمی آن را خارج نموده و

