

اینترفرون آلفا

اینترفرون آلفا با خاصیت ضد ویروس، آنتی نئو پلاسم و تحریک کننده سیستم ایمنی در درمان لوسمی، کارپوس سارکوما وابسته به ایدز و هیپاتیت نوع D, C, B مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً تمام بیماران مصرف کننده اینترفرون آلفا عوارض ناشی از این فرآورده را تجربه می کنند. عوارض مهم اینترفرون آلفا عوارض شبه انفلوانزا، عوارض گوارشی، عوارض عصبی و عوارض خونی است.

عوارض شبه انفلوانزا با علائم تب (۴۰-۳۸ درجه سانتیگراد)، خستگی، درد عضلانی، لرز، تاکیکاردی، بی اشتهایی، کاهش وزن، کمر درد، گیجی و در بعضی موارد کرامپ شکمی و اسهال نظاهر می کند. از جمله عوارض خونی اینترفرون آلفا لکوپنی (بخصوص نوتروپنی)، آنمی و ترومبوسیتوپنی است که در ۴۲-۳٪ بیماران رخ می دهد. ترومبوسیتوپنی و آنمی معمولاً به راحتی تحمل می شود. هر چند در مواردی ترومبوسیتوپنی آنقدر شدید است که بیمار مجبور به قطع دارو درمانی می شود. بروز لکوپنی (به عنوان مثال گرانولوسیتوپنی) منجر به قطع دارو می گردد. لکوپنی و ترومبوسیتوپنی با قطع دارو سریع برگشت می کند ولی برگشت آنمی به آهستگی صورت می گیرد. از جمله عوارض خونی دیگر، کاهش تعداد پلاکت است که معمولاً طی ۴-۲ هفته اول بروز می کند.

شایع ترین عوارض عصبی ناشی از اینترفرون آلفا خستگی، سردرد و گیجی می باشد. اختلال در خواب (کم خوابی و پرخوابی)، اضطراب، سرگیجه و فراموشی در کمتر از ۱ درصد بیماران گزارش شده است.

از جمله عوارض شایع دیگر اینترفرون آلفا می توان به بثورات جلدی، آلویسی و نازک شدن مو اشاره کرد که در ۲۵ درصد از بیماران به وقوع می پیوندد. اریتم، خارش و کهیر از دیگر عوارض پوستی این دارو است. آلویسی ناشی از این دارو معمولاً ۳ ماه بعد از شروع درمان به وقوع پیوسته و معمولاً پس از گذشت ۳-۱ ماه پس از قطع اینترفرون آلفا به حالت اولیه بر می گردد.

با توجه به افزایش مصرف اینترفرون آلفا در ایران طی سال های گذشته و لزوم پیگیری عوارض احتمالی ناشی از مصرف دارو خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه عارضه ناشی از دارو، موضوع را از طریق آدرس تهران - صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۱۸۵ به این مرکز اطلاع دهید. جهت اطلاع بیشتر می توانید با شماره تلفن ۶۴۰۵۵۶۹ تماس حاصل فرمایید.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه - معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی