

اشتباه در تنظیم مقدار مصرف فرآورده ترکیبی آمپی سیلین/سولباکتام

هنگام تجویز و مصرف فرآورده های ترکیبی حاوی چند ماده موثره، به مقادیر هر یک از اجزا و نیز مجموع مقادیر مواد موثره توجه نمایید و اطمینان یابید که مقدار مصرف مورد نظر بر مبنای کدام یک (مجموع مقادیر مواد موثره یا مقدار یکی از اجزای موجود) تنظیم شده است تا از بروز اشتباهات دارویی پیشگیری شود.

به اطلاع همکاران محترم می رساند مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR) گزارشی مبنی بر بروز اشتباه در محاسبه مقدار مصرف ویال آمپی سیلین/ سولباکتام با نام تجاری آمپی سول دریافت نموده است. ویال ۱/۵ گرمی آمپی سول حاوی ۱ گرم آمپی سیلین و ۰/۵ گرم سولباکتام می باشد.

بر طبق گزارش ارسالی به مرکز ADR ، مقدار مصرف نوشته شده برای بیمار به صورت آمپی سول ۳ گرم بوده است که هنگام تزریق به بیمار به اشتباه ۳ ویال ۱/۵ گرمی (معادل ۴/۵ گرم آمپی سول) بجای ۲ ویال ۱/۵ گرمی (معادل ۳ گرم آمپی سول) به بیمار تزریق شده است.

علت بروز این اشتباه، عدم اطمینان از محاسبه دوز تجویزی بر مبنای مقدار کلی فرآورده ترکیبی آمپی سول (۱/۵ گرم) یا مقدار آمپی سیلین موجود در آن (۱ گرم) بوده است.

لذا به منظور پیشگیری از بروز این قبیل اشتباهات، توصیه می شود تا پیش از تجویز و تزریق فرآورده های ترکیبی حاوی بیش از یک ماده موثره، حتماً نام و مقدار هر یک از مواد موثره موجود در فرآورده به دقت بررسی شده، نسبت به تجویز و مصرف دوز صحیح فرآورده اطمینان حاصل شود.

از همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه عارضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ و یا از طریق سایت www.adrmc.ir، نمابر (۸۸۸۹۰۸۵۷) یا تماس تلفنی (۴-۸۸۹۲۳۱۹۳) به مرکز ADR گزارش نمایند.