

تشخیص و مراقبت از کاردیومیوپاتی در بارداری
 پری پارتوم کاردیومیوپاتی **peripartum cardiomyopathy** شکلی از کاردیومیوپاتی احتقانی (**dilated cardiomyopathy**) است.

این بیماری معمولاً در ماه آخر حاملگی تا پنج ماه بعد از زایمان اتفاق می‌افتد و مانند دیگر موارد کاردیومیوپاتی احتقانی با اختلال عملکرد سیستولیک و کاهش **ejection fraction** بطن چپ و آریتمی دهلیزی یا بطيه همراه است. امکان آمبولی و مرگ ناگهانی در این بیماری زیاد است. علت این بیماری ناشناخته است و موارد زیر می‌تواند زمینه ساز آن باشد: چاقی، سابقه خانوادگی میوکاردیت، مصرف سیگار و الكل، حاملگی های متعدد، سوءتعذیه، دوقلوزایی، سن بالای ۳۰ سال علایم عبارتند از: خستگی، طیش قلب، ادرار شبانه به طور مکرر، تنگی نفس، ادم و تورم، ارتوپنه (تنگی نفس در حال دراز کشیده)، سرفه ای که توجیهی برای آن نیست، افزایش وزن بیش از یک تا دو کیلوگرم در هفته، درد فسسه صدری

جدول اسکرین **PPCM** برای یافتن زود هنگام علایم نارسایی قلب در آخرین ماه حاملگی

- | | | |
|---|-----------------------|---------|
| ارتوپنه (مشکل تنفسی در حالت دراز کشیده) | الف: ندارد = ۰ امتیاز | ب: دارد |
| - در هنگام دراز کشیدن زیر سرش باید بلند باشد تا تنگی نفس پیدا نکند = ۱ امتیاز | | |
| - باید شبها زیر سر زاویه ۴۵ درجه و بیشتر بلند باشد تا دچارتگی نفس نشود = ۲ امتیاز | | |

- | | | |
|--|-----------------------|---------|
| تنگی نفس | الف: ندارد = ۰ امتیاز | ب: دارد |
| - وقتی از هشت پله و بیشتر بالا می‌رود، تنگی نفس پیدا می‌کند = ۱ امتیاز | | |
| - وقتی در سطح صاف راه می‌رود، تنگی نفس پیدا می‌کند = ۲ امتیاز | | |

- | | | |
|--|-----------------------|---------|
| سرفه غیرقابل توجیه | الف: ندارد = ۰ امتیاز | ب: دارد |
| - در هنگام شب و در حالت دراز کشیده، سرفه می‌کند = ۱ امتیاز | | |
| - در طول شب و روز سرفه می‌کند = ۲ امتیاز | | |

- | | | |
|--|-----------------------|---------|
| ادم و تورم اندام تحتانی | الف: ندارد = ۰ امتیاز | ب: دارد |
| - ادم تا زیر زانو است = ۱ امتیاز | | |
| - ادم بالای زانو و یا در صورت = ۲ امتیاز | | |

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| افزایش وزن در طول ماه آخر بارداری: | الف: ندارد و یا زیر ۹۰۰ گرم تا یک کیلوگرم در هفته: ۰ امتیاز | ب: دارد |
| - یک تا دو کیلوگرم در هفته: ۱ امتیاز | | |
| - بیش از دو کیلوگرم در هفته: ۲ امتیاز | | |

- | | | |
|--|----------------------|---------|
| طیش قلب (احساس ضربان قلب یا احساس نامنظمی در ضربان قلب): | الف: ندارد: ۰ امتیاز | ب: دارد |
| - وقتی در هنگام شب دراز کشیده است، این احساس را دارد: ۱ امتیاز | | |
| - شب و روز این احساس را دارد: ۲ امتیاز | | |

- | | | |
|--|--|--|
| امتیازدهی و اقدام | | |
| ۰ تا ۲ امتیاز: خطر بسیار کم، تحت نظر متخصص زنان و قلب باشد | | |
| ۳ تا ۴ امتیاز: خطر خفیف، اندازه گیری BNP و CRP و درصورتی که BNP و CRP بالا باشد، اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب | | |
| ۵ امتیاز یا بیشتر: خطر بالا، BNP و CRP و اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب | | |

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.