

روز (۳۱ تا ۳۱) ماه (۱۲ تا ۱۲) سال (۱۴۰۰ تا ۱۳۹۸)	تاریخ ایجاد زخم
اورژانس (۱) ☐ حاد (۲) ☐ بستری ☐ جراحی: (۱) جراحی دو (۲) جراحی سه (۳) جراحی چهار (۴) جراحی پنج (۵) جراحی هفت (۶) ☐ داخلی: (۱) نرولوژی (۲) PCCU (۳) داخلی یک (۴) داخلی دو (۵) عفونی (۶) آنکولوژی (۷) اطفال ☐ ویژه: (۱) ICU توراکس (۲) ICU جنرال (۳) ICU تنفس (۴) ICU اورژانس (۵) PICU (۶) NICU (۷) CCU ☐	بخش محل بروز زخم
(۱) طول سانتی متر (۵۰ تا ۵۰۰) (۲) عرض سانتی متر (۵۰ تا ۵۰۰) (۳) عمق سانتی متر (۵۰ تا ۵۰۰)	اندازه زخم
نکروز (سیاه) ☐ اسلاف (زرد رنگ) ☐ گرانوله (قرمز رنگ) ☐ اپیتلیالیزه (صورتی) ☐ هایپرگرانولیشن ☐ ترکیبی ☐	نوع بافت زخم
فاقد ترشح، خشک ☐ خیلی کم، زخم مرطوب است اما به مقداری نیست که پانسمان را خیس کند ☐ کم: کمتر از ۲۵ درصد خیس میشود ☐ متوسط: بین ۲۵ الی ۷۵ درصد پانسمان خیس میشود ☐ زیاد: بالای ۷۵ درصد پانسمان خیس میشود ☐	مقدار ترشحات
خونی ☐ خونابه ای، شفاف، رقیق، آبکی، صورتی یا قرمز رنگ پریده ☐ سרוزی، شفاف، آبکی، رقیق ☐ چرکی رقیق یا غلیظ، کدر، قهوه ای مایل به زرد، با یا بدون بو ☐ خونی چرکی ☐	نوع ترشح
آبی (کبود) ☐ قرمز ☐ بنفش ☐ سالم ☐	رنگ پوست اطراف
شکننده ☐ ملتهب ☐ ادم ☐ خیس ☐ خشک ☐	پوست اطراف این آیتم چند گزینه ای است

☐ سفت	علائم بالینی عفونت این آیتم چندگزینه ای است
☐ سرد	
☐ گرم	
☐ درماتیت	
☐ ندارد	
☐ درد	
☐ گرمی	
☐ قرمزی اطراف	
☐ تندرئس	
☐ ترشحات چرکی	
☐ تشکیل بافت نکروز جدید	
☐ افزایش بو	
☐ بافت گرانوله شکننده	
☐ افزایش ترشحات	
☐ تب	
☐ بافت سفید یا خاکستری مرده یا اسلاف زرد غیر چسبنده به زخم	نوع بافت نکروز
☐ اسلاف زرد به طور شل چسبیده	
☐ اسکار سیاه نرم چسبنده	
☐ اسکار سیاه سخت شدیداً چسبنده	
☐ کمتر از ۲۵ درصد بستر زخم را پوشانده است	مقدار بافت نکروز
☐ ۲۵ الی ۵۰ درصد بستر زخم را پوشانده است	
☐ بیشتر از ۵۰ و کمتر از ۷۵ درصد بستر زخم را پوشانده است	
☐ ۷۵ الی ۱۰۰ درصد زخم را پوشانده است	
☐ ۱۰۰ درصد زخم پوشانده شده است با بافت اپیتلیالیزه، سطح صاف	مقدار بافت اپیتلیالیزه
☐ ۷۵ الی ۱۰۰ درصد زخم از بافت اپیتلیالیزه پر شده است یا بافت اپیتلیالیزه بیشتر از ۵ میلیمتر به داخل زخم گسترش پیدا کرده است	
☐ ۵۰ الی ۷۵ درصد زخم از بافت اپیتلیالیزه پر شده است یا بافت اپیتلیالیزه کمتر از ۵ میلیمتر به داخل زخم گسترش پیدا کرده است	
☐ ۲۵ تا ۷۵ درصد زخم از بافت اپیتلیالیزه پوشیده شده است	
☐ کمتر از ۲۵ درصد زخم با بافت اپیتلیالیزه پوشیده شده است	
☐ روشن، قرمز فریه، ۷۵ الی ۱۰۰ درصد زخم پر شده است یا هایپرگرانوله	مقدار بافت گرانوله
☐ روشن، قرمز فریه، ۲۵ الی ۷۵ درصد زخم پر شده است	
☐ صورتی یا قرمز تاریک و کدر یا کمتر از ۲۵ درصد زخم پر شده است	
☐ وجود ندارد	
☐ کمتر از یک چهارم	نقب
☐ بیشتر از یک چهارم و کمتر از نصف	
☐ بیش تر از نصف	
☐ بیش تر از سه چهارم یا همراه با تونل	

تونل	☐ دارد
	☐ ندارد
لبه های زخم	غیر واضح، به طور مشخصی دیده نمی شود ☐
	واضح، طرح کلی به وضوح دیده می شود، لبه ها به بستر زخم چسبیده است ☐
	خوب تعریف شده است اما به بستر زخم متصل نیست ☐
	خوب تعریف شده است و به بستر زخم متصل نیست، به داخل برگشته است و ضخیم شده است ☐
	لبه ها خوب تعریف شده است، فیبروتیک است، هیپر کراتوزه است ☐
درجه زخم	درجه ۱ ☐
	درجه ۲ ☐
	درجه ۴ ☐
	نکروز ☐
	احتمال آسیب عمیق بافتی ☐
کشت	☐ دارد
	☐ ندارد
نتیجه کشت این آیتم چندگزینه ای است	استف آرئوس ☐
	استرپتوکوک ☐
	استفیلوکوک ☐
	آسیکلوباکتر ☐
	قارچ ☐
	اینتروباکتر ☐
	سودومونا آئروژینا ☐
	سایر
زخم ناشی از تجهیزات پزشکی	بله ☐ خیر ☐
نوع تجهیزات پزشکی عامل	ماسک ☐ لوله تراشه ☐ دستبند جوراب ☐ ند ☐ باند ☐ NGT ☐ سایر ☐

دبریدمان این آیتم چندگزینه ای است	☐ ندارد
	اتولایتیک ☐
	جراحی ☐
	شارپ ☐
	بیولوژیک ☐
	آنزیمی ☐
	مکانیکی ☐
محلول شستشو این آیتم چندگزینه ای است	سرم شستشو
	آب معمولی
	انتی سپتیک (۱) آب اگسیژنه (۲) کلرهگزیدین (۳) آب فعال شده (۴) بتادین (الف) خالص (ب) رقیق شده

اسپری (۱) نیواشا (۲) سیلو سپت (۳) پرونتوسان			
(۱) گاز خشک (۲) گاز خیس (۳) گاز وازلین		گاز	پانسمان این آیتم چندگزینه ای است
(۱) کامفیل (۲) هیدروکل (۳) دودرم (۴) سوپرابزورب H		هیدروکلویید	
(۱) نقره (۲) ساده		آلژینات کلسیم	
(۱) ساده (۲) نقره (۳) آنتی باکتریال		هیدروژل	
فیلم			
(۱) مپلیکس (۲) آسکینا (۳) فارم اکتیو (۴) هیدروتک (۵) بیاتین (۶) غیره		فوم	
NPWT			
(۱) عسل طبیعی (۲) عسل نیکا (۳) عسل ۴۰۵ (۴) آلژینات عسل (۵) شیت عسل		عسل	
(۱) کل اکتیو پلاس ساده (۲) کل کتیو پلاس AG (۳) طبادرم (۴) سوپرابزورب C		کلاژن	
(۱) نیودرم (۲) زینک (۳) سیلور (۴) فنی توپین (۵) ابوخلسا (۶) ایدوزروب (۷) آ.د (۸) آنتی بیوتیک		پماد	
(۱) تتراسایکلین (۲) سولفادیازین (۳) موپرسین (۴) نیتروفورانتین		نوع پماد آنتی بیوتیک	
داخل اتاق، دور از بیمار پانسمان بسته، بو حس میشود		خیلی شدید ☐	شدت بو
داخل اتاق، دور از بیمار، پانسمان باز، بو حس میشود		شدید ☐	
داخل اتاق، نزدیک بیمار، پانسمان بسته، بو حس میشود		متوسط ☐	
داخل اتاق، نزدیک بیمار، پانسمان باز، بو حس میشود		کم ☐	
داخل اتاق، نزدیک بیمار، پانسمان باز، بو حس نمیشود		فاقد بو ☐	
دبریدمان ☐			
جذب ترشحات و گرفتن رطوبت ☐		اهداف درمانی این آیتم چندگزینه ای است	
رطوبت دادن به زخم ☐			
حفاظت و جلوگیری از فشار ☐			
تسکینی و کانزرویتیو ☐			
کاهش لود باکتری ☐			
کنترل عفونت ☐			

فرم ارزیابی زخم فشاری

fingers		heel		I malleolus		E malleolus		knee		leg		vertebra	elbow		scapula		ear		lip	nose	occiput	sacroiliac		ischium		trocanter		buttock		coccy x	sacrum	مشخصات زخم				
hand	leg	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L		R	L	R	L	R	L				R	L	R	L	R	L	R	L							
																																درجه				
																																بروز یا شیوع یا تغییر درجه				
																																زخم ناشی از تجهیزات پزشکی				
																																نوع تجهیزات پزشکی عامل				
در صورت تغییر درجه یا بروز در بیمارستان مدت زمان ایجاد زخم بعد از بستری و تغییر درجه و بخش مربوطه تکمیل گردد																																				نام بخش محل بروز
																																مدت زمان ایجاد زخم یا تغییر درجه				
																																نوع بافت				
																																طول عرض عمق				
																																علائم عفونت				
																																میزان ترشحات نوع ترشحات				
																																پوست اطراف رنگ پوست اطراف				
																																لبه های زخم اهداف درمانی دبریدمان محللول شستشو پاتسمان				
آیتم های زیر فقط برای زخم های درجه ۳ و بالاتر تکمیل گردند																																				نقب
																																توئل کشت نتیجه کشت شدت بو				
آیتم های زیر برای زخم های درجه سه و بالاتر که دارای بافت نکروزه و یا ترکیبی باشند تکمیل گردد(اگر نوع بافت فقط نکروزه باشد فقط آیتم اول تکمیل گردد و اگر نوع بافت ترکیبی باشد همه آیتم ها تکمیل گردند)																																				نوع بافت نکروز مقدار بافت نکروز مقدار بافت گرتوله مقدار بافت اپیتلیالیزه

