

راهنمای آموزشی مادران جهت شیردهی تشخیص کافی بودن شیر مادر

بهترین راه تشخیص کافی بودن شیر مادر، افزایش وزن شیرخوار براساس منحنی رشد است، اگر بخواهید به طور روزانه از این مسئله اگاهی پیدا کنید بهترین راه، توجه به ادرار و مدفوع او می باشد. از ۵ روزگی تا ۸-۶ هفتگی باید حداقل ۵ تا ۶ مرتبه روزانه خود را خیس کند و در هر ۲۴ ساعت ۳-۴ تکه مدفوع زرد رنگ به اندازه کف دست دفع کند گریه زیاد شیرخوار نشانه کافی نبودن شیر مادر نیست، گریه نوزادممکن است به علت خیس بودن پوشک، سرد یا گرم بودن، دل درد و ... باشد. افزایش وزن شیرخوار در ۶ ماه اول تولد هر هفته به میزان ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم می باشد تعداد کهنه های خیس نوزاد می تواند نشان دهنده کافی بودن شیر مادر باشد تعداد ۶ کهنه مروطوب یا بیشتر در ۲۴ ساعت از روز چهارم تولد به بعد نشانه کافی بودن شیر مادر می باشد.

برخی مزایای شیر مادر:

آغوز یا شیر روزهای اول تولد که زرد رنگ و غلیظ است بسیار معزی و حاوی مواد مفید و ارزنده ای است که اولین و بهترین واکسن برای حفاظت کودک علیه بیماری های عفونی است.

ضریب هوشی در کودکان شیر مادر خوار بالاتر است. شیر مادر بسیار سهل الهضم است و شیرخواران زود به زود گرسنه می شوند.

شیر مادر همیشه گرم و تمیز است و پیوسته در دسترس است. کودکی که با شیر مادر تغذیه می کند کمتر دچار ناهنجاری های فک و رویش نا به جای دندان و پوسیدگی آن می شود. شیر مادر نیازهای غذایی شیرخوار را در ۶ ماهه اول تامین می کند و شیرخوار حتی به آب هم نیاز ندارد. تغذیه با شیر مادر رابطه عاطفی بین مادر و فرزند را افزایش داده و باعث رشد روانی و عاطفی شیرخوار می گردد. احتمال ابتلاء به آسم، آرژی و ناراحتی های گوارشی و گوش درد در کودکانی که از شیرمادر تغذیه می کنند کمتر است.

وضعیت صحیح مادر هنگام شیر دادن و نحوه گرفتن صحیح پستان

- * شانه و گردن مادر باید آزاد و راحت باشد.
- * در وضعیت راحت بنشینید یا دراز بکشید.

روش صحیح تغذیه شیر خوار

- * پس از تولد بلافضله نوزاد را روی سینه مادر در تماس پوست با او قرار دهید و ظرف یک ساعت پس از تولد شیردهی را شروع کنید.
- * شیرخوار وقتی احساس کند که سیر شده است خودش پستان را رها می کند و در این حالت نوک پستان کشیده - دیده می شود.
- * دوشیدن شیر با دست بهترین روش دوشیدن شیر است. فکر کردن به شیر خوار و نگاه کردن به او، حمام کردن و گرم نمودن پستان با استفاده از حolle گرم به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به جاری شدن شیر کمک میکند.
- * پس از تولد بلافضله نوزاد را روی سینه مادر در تماس پوست با او قرار دهید و ظرف یک ساعت پس از تولد شیردهی را شروع کنید.

احتیاطات شیردهی در مادران مبتلا به بیماری کرونا

- * در صورتی که مادر شیرده مبتلا به بیماری کرونا ویروس، بدهال باشد، موقتاً نوزاد با شیر اهدایی بانک شیر و یا شیر خشک تغذیه گردد.
- * با بهبود حال عمومی، شیردهی از پستان به نوزاد میتواند شروع شود که ممکن است مستقیم و یا از طریق شیردوش باشد. در شسته و بعد از دوشیدن شیر نیز اجزای شیردوش از هم جدا و همگی طبق راهنمای سازنده آن، ضدغفونی گردد.
- * شیر دوشیده شده باید توسط همراه سالم به نوزاد خورانده شود.
- * در موقع شیردهی مستقیم توصیه میشود که مادر، ماسک پوشیده و بهداشت دست های خود را قبل از شیردهی رعایت کند.

منبع:

- راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ با علائم خفیف در منزل (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
- پیملت آموزشی بیمارستان آرایا
- اطلاعات ضروری برای بیماران قلبی تحت درمان با وارفارین- گروه آموزشی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - بیمارستان امام علی (ع)

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام علی(ع)

به اندازه کافی برای سیر شدن کودک شیر در انها وجود دارد.

چرا کودک علاقه زیادی به شیر خوردن در شب دارد؟

این مسئله کاملاً طبیعی وقابل پیش بینی می باشد. نوزادان یک زمان مشخصی را برای تغذیه کلی انتخاب می کنند. در این حالت کودک تمایل دارد تا در فواصل زمانی متعدد از شیر مادر تغذیه کرده و در بین انها استراحت کوتاهی نیز داشته باشد. امکان دارد چندین ساعت بخواهد بدون وقفه شیر بخورد متاسفانه بسیاری از خانواده ها تصور می کنند که این امر به دلیل مغذی نبودن شیر مادر اتفاق می افتد.

توجه : برای جمع آوری شیر مادر از لیوان پلاستیکی تمیز استفاده کنید .

شیر دوشیده در حرارت معمولی اتاق بین ۶ تا ۸ ساعت و در یخچال تا ۴۸ ساعت، در جای يخی یخچال تا ۲ هفته و در فریزهای معمولی تا ۳ ماه قابل استفاده است.

صرف وارفارین و شیردهی

*مادرانی که به دلایل مختلف تحت درمان با وارفارین می باشند می توانند علی رغم مصرف وارفارین به نوزاد خود شیر بدهنند.

*شیر مادر حاوی تمام مواد مغذی است، کودک را در شش ماه اول تولد فقط با شیر مادر تغذیه کنید.

* از دادن آب، آب قند، شیر مصنوعی و غذاها در ۶ ماه اول به شیرخوار بپرهیزید.

* مهمترین عامل در افزایش شیر مادر، مکیدن مکرر و تخلیه مرتب پستان ها برحسب میل شیرخوار است.

* شیرخوار باید ۸-۱۲ بار در شبانه روز شیر بخورد.

* شیردهی شبانه برای تولید کافی شیر و پیشگیری از باروری حائز اهمیت است.

* از به کار بردن پستانک و شیشه شیر که سبب کاهش میل مکیدن پستان توسط شیرخوار و انتقال آلودگی می شود، جدا پرهیز کنید.

* برای چند هفته اول تولد نوزاد توصیه میشود که فرزندان خود را برای شیر دهی حداقل هر دو سه ساعت یکبار بیدار کنید. اگر کودک شما میتواند شبهها قدری طولانی تر بخوابد هیچ اشکالی ندارد. ولی اگر کودک شما زودتر از زمان مقرر برای شیر دهی بیدار شد و یا شروع کند به گریه کردن و مکیدن انگشتان نباید او را دو سه ساعت منتظر نگه دارید تا زمان شیر دهی فرا برسد و باید همان موقع به او شیر بدھید حتی اگر زمان کوتاهی از زمان شیر دهی گذشته باشد.

اصلاً نگران نباشید که شیر موجود در سینه ها تخلیه شود شیر به طور مکرر در سینه ها درست شده و همیشه